

CONSEJO DE SALUD DE WYOMING
INSERCIÓN DE IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS
HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE/CONSENTIMIENTO/CONSENTIMIENTO

Entiendo que un implante anticonceptivo es un tipo de implante anticonceptivo que consiste en una pequeña varilla flexible, que contiene una forma de la hormona progestina. Se implantará justo debajo de la piel de mi brazo superior. Entiendo que el implante anticonceptivo me impedirá quedar embarazada hasta por 3 años. Después de tres años, el implante ya no es eficaz y debe ser sacado. Puedo insertar otro implante anticonceptivo en ese momento o empezar a usar otro método anticonceptivo. También sé que puedo extirpar el implante en cualquier momento y por cualquier motivo.

Entiendo que el implante anticonceptivo es más eficaz en la prevención del embarazo que la píldora. El implante anticonceptivo no es permanente. Puedo quedar embarazada después de que me lo saquen. Entiendo que el implante anticonceptivo podría no ser tan eficaz si tomo ciertos medicamentos (principalmente medicamentos para las convulsiones) o el remedio herbario llamado St. John's Wort.

Soy consciente de que las mujeres que usan un implante anticonceptivo tienen cambios en sus períodos menstruales. Algunas mujeres detectan o sangran más a menudo, y algunas mujeres sangran menos o no sangran en absoluto. La detección entre períodos es común. Entiendo que algunas mujeres también podrían tener aumento de peso, dolores de cabeza o depresión. Entiendo que el implante no me protege de enfermedades de transmisión sexual, incluido el virus que causa el VIH. Necesito usar condones para protegerme de las infecciones.

Me han dicho qué esperar cuando se pone y se saca el implante. Soy consciente de que podría sentir cierta incomodidad durante y después de estos procedimientos. Se me han hablado de los problemas que podrían ocurrir al poner o sacar el implante tales como: respuesta alérgica al anestésico; hematomas o dolor alrededor del sitio de inserción; o infección. Después de poner el implante anticonceptivo, podría salir accidentalmente; esto es raro, sin embargo. Cuando se saca el implante, podría romperse.

Extirpar el implante puede ser un poco más difícil que ponerlo. A veces se necesitan dos visitas a la clínica antes de que se pueda sacar la varilla del implante.

Tengo una copia de la información escrita del paciente que da más detalles sobre estos y otros riesgos / efectos secundarios.

Sé llamar a la clínica si:

- ¿Quieres que me saquen mi implante anticonceptivo;
- Tiene sangrado de color rojo brillante intenso de la vagina que es más de un período;
- Tener un período tardío después de que mis períodos han sido a tiempo;
- Tiene dolor, pus, sangrado o piel roja donde se puso el implante anticonceptivo, o si sale mi cápsula de implante anticonceptivo;
- Tiene muy dolor en la parte inferior del estómago o el abdomen;
- Tener muy malos dolores de cabeza o problemas con mi visión

La información anterior se me ha presentado en forma oral y escrita. Entiendo la información y mis preguntas han sido respondidas.

Basándome en mi conocimiento de lo anterior, doy mi consentimiento para que se inserte un implante anticonceptivo.

Firma del cliente _____ Fecha _____

Firma del proveedor _____ Fecha _____

Información de identificación del intérprete _____

Fuente: CDPHE FPP • Revisado 2-2015 / WHC 8-2015 Revisado 9-2020

SAMPLE